

Ann-Berit Pedersen  
annp@odense.dk  
21 47 03 61

Lotte O. Christensen  
loch@odense.dk  
23 65 72 70

Karina Bastrup  
hkb@odense.dk  
20 19 56 52

Anette Birkenfeldt  
anen@odense.dk  
23 43 68 77

### I DETTE NUMMER:

Symptomer på tandfrembrud 1

Hvordan hjælper barnet? 2

Hvis barnet får feber 2


Kan barnet komme i pasningsordning? 2

## Børn og tandfrembrud

Barnet får som regel den første mælketand når det er mellem 4 og 8 måneder gammelt, og barnet vil normalt have alle 20 mælketænder, når det er ca. 3 år. De første tænder, der bry-

der igennem er oftest de 2 midterste i undermundens. Gommen bliver rød, hævet og irriteret, der hvor tanden bryder igennem. Efter 1-2 dage kan man ane toppen af den hvide

tand, inden den hurtigt herefter bryder igennem. Barnet kan være generet et par dage før, og et par dage efter tandfrembruddet.



## Symptomer på tandfrembrud

Barnet:

- har rød, hævet, kløende og irriteret gumme
- savler mere end det plejer
- kan være afvisende ved måltiderne
- vil gerne bide i alt
- kan være mere irriteret
- kan have løs afføring

## Hvordan hjælpes barnet?

Barnet kan have glæde af:

- en bidering
- evt. en bidering der kan lægges i køleskabet
- at få masseret gummerne med en blød tandbørste
- at få ekstra omsorg
- Suttet, som kan have en beroligende effekt

Hvis barnet er over 6 måneder, kan en agurke- eller gulerodsstav fra køleskabet være god at sutte på – selvfølgelig under opsyn!

**LOKALBEDØVENDE MEDICIN TIL GUMMERNE, ELLER PANODIL, I FORM AF MIKSTUR ELLER STIKPILLER, SKAL KUN GIVES TIL BARNET EFTER AFTALE MED EGEN LÆGE!**

## Hvis barnet får feber

Hos nogle børn kan der ses en sammenhæng mellem tandfrembrud og feber. Hvis barnet får temperatur over

38,5 i 1-2 dage, skal barnet ses af egen læge. Så skyldes temperaturforhøjelsen ikke tandfrembrud, men at

barnet kan have en infektion.



## Kan barnet komme i pasningsordning, når der er tænder på vej?

Børn der har feber, er ofte mere irritable og trætte end normalt, og kan derfor ikke deltage i de aktiviteter der er i pasningsordningen. Hvis barnet har feber, må det ikke komme i

pasningsordningen, selv om man tror, det er tandfrembruddet, der giver feber. Hvis barnet er alment påvirket, skal det blive hjemme til det er velbefindende.

Børn der dagligt har 2-3 løse afføringer, i forbindelse med tandfrembrud, må gerne komme i pasningsordning.