



Opdatering vedrørende vancomycin-resistente enterokokker (VRE) til primær sektor

OUH ændrer sin håndtering af VRE med virkning fra 23/12 21, og patienter med VRE vil herefter ikke blive isoleret i forbindelse med indlæggelse.

VRE har længe givet anledning til international og national opmærksomhed på grund af multiresistens og stigende forekomst. OUH har de seneste 3 år haft en intensiv infektionshygiejnisk indsats for at hindre spredning af VRE, indbefattende screening og anvendelse af isolation af patienter med VRE.

Infektionshygiejnisk enhed og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har fulgt op og gennemgået OUH's data på området. Disse viser, at trods flere screeningsfund er den kliniske betydning af VRE meget lille, og at et VRE-fund kun i få tilfælde giver anledning til antibiotisk behandling eller infektion. Derfor vil screening for VRE ophøre, og alle patienter med fund af VRE vil blive håndteret som øvrige patienter med generelle infektionshygiejniske forholdsregler.

I primærsektoren anbefales således fortsat, at man overholder de generelle infektionshygiejniske forholdsregler, herunder håndhygiejne og brug af relevante værnemidler også hos borgere med VRE: <https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da>.

Borgere med fund af VRE vil ikke blive isoleret ved indlæggelse på hospital og 6 måneders reglen bortfalder. Ligeledes ophører screening for VRE.

I almen praksis skal man ligeledes fortsat efterleve de generelle infektionshygiejniske forholdsregler som bekræftet i NIR for almen praksis: <https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-almen-praksis.pdf?la=da>

Infektionshygiejnisk Enhed og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vil fortsat følge området tæt, så tiltag kan iværksættes, hvis der kommer betydende ændringer i fund eller viden på området.

Med venlig hilsen

Infektionshygiejnisk Enhed, OUH
December 2021